




POTI stopa răspândirea PPA

Pesta porcină africană (PPA) este o boală virală mortală a porcilor domestici și sălbatici. Este o amenințare la adresa sănătății porcilor întrucât nu există vaccin sau tratament împotriva acesteia. PPA nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor dar poate duce la consecințe socio-economice catastrofale pentru sectorul de creștere al porcilor.

Ca medic veterinar, aveți un rol crucial în protejarea producției de porci în fața acestei boli devastatoare.

RECUNOAȘTEREA PPA

Semnele clinice includ:



PPA poate semăna cu:

- Pesta porcină clasică (PPC)
- Sindromul reproductive și respirator porcin (PRRS)
- Rujet
- Salmoneloză (și alte septicemii bacteriene)
- Boala Aujeszky (sau pseudoturbarea)
- Pasteureloză
- Otrăvire
- Dermatită porcină și sindromul de nefropatie (PDNS)

CONFIRMAȚI DIAGNOSTICUL PRIN TESTE DE LABORATOR

Probele recomandate: sânge sau ser, organe, țesuturi (splina, limfonoduri, tonsile, plămâni, rinichi și măduva osoasă).

Urmați cele mai bune practici cu probele dvs.:



Colectați-le aseptic și spălați-vă mâinile înainte și după recoltare



Manipulați atent pentru a evita degradarea, contaminarea sau vărsarea



Împachetați, sigilați, ambalați și etichetați-l conform instrucțiunilor de laborator



Expediați proba la laborator cat mai rapid posibil

CE SĂ FACI DACĂ SUSPECTEZI SAU SE CONFIRMĂ PPA LA FERMĂ



ANUNȚĂ

Autoritățile sanitare veterinare naționale cat se poate de urgent



ADUNĂ

Informațiile epidemiologice cheie despre fermă și animale



CARANTINEAZĂ

Fermele suspecte sau infectate



ALERTEAZĂ

Fermierii învecinați



EVITĂ VIZITAREA

Altor ferme pentru cel puțin 48 de ore



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

